



Brèves de territoires

Le Xénope, une menace pour nos batraciens ?

Originaire d'Afrique australe, le Xénope lisse ou Xénope du Cap (*Xenopus laevis*) est un batracien introduit en France au milieu du XX^e siècle comme animal de laboratoire. Utilisé comme test de grossesse, puis comme organisme modèle en biologie du développement, il a fait l'objet d'un élevage dans le nord des Deux-Sèvres dans les années 80. Suite à la fermeture de ce centre, des individus ont gagné le milieu naturel où ils ont fait souche. Résistant à la sécheresse et au froid, porté par une dynamique de reproduction impressionnante, le Xénope a rapidement colonisé étangs, mares et ruisseaux à cours lent du secteur où sa densité

peut atteindre 1 000 individus par mare. Essentiellement aquatique mais capable de déplacements sur de courtes distances, il progresse à raison d'un kilomètre par an. La population est localisée dans le nord des Deux-Sèvres, le sud du Maine-et-Loire et la région de Loudun dans la Vienne. Quelques individus ont récemment été repérés en Loire-Atlantique.

La Leucorrhine à gros thorax reproductrice dans l'Indre

Une femelle fraîchement émergée de Leucorrhine à gros thorax *Leucorrhinia pectoralis*, et son exuvie, ont été découvertes le 20 avril 2014 sur un étang de la commune de Migné, Indre. Si quelques individus avaient fait l'objet d'obser-

vations en Brenne, ces vingt dernières années, c'est la première fois depuis 128 ans, qu'une preuve de reproduction est apportée. Inscrite à l'annexe II de la directive habitats, protégée en France, cette libellule est considérée comme « en danger » sur la liste rouge régionale. Elle est connue dans moins de dix localités en région Centre-Val de Loire.

Source : Indre Nature.

Orchidées sauvages : une espèce sur six menacée en France

Selon une étude publiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 27 espèces d'orchidées sur les 160 présentes

Sommaire

Brèves de territoires

p. 4

Rendez-vous nature

p. 7

En quête de biodiversité

- Effectifs et distribution des oiseaux d'eau patrimoniaux en Sologne de 2000 à 2010. p. 8
- L'Edicnème criard dans le Loir-et-Cher : résultats du dénombrement des années 2004-2005. p. 21
- Synthèse de l'étude sur la répartition et le suivi des populations de Cistude d'Europe en Sologne entre 2008 et 2013. p. 24
- Aperçu du choix des proies et tactique alimentaire chez le Guêpier d'Europe dans le Val de Loire. p. 30
- Un site particulièrement intéressant pour l'étude des « Apoidea Sphéciiformes » en Sologne de Loir-et-Cher. p. 33

- Note sur l'élévation au rang d'espèce de *Bufo spinosus* et discussion sur la répartition de l'espèce en région Centre-Val de Loire. p. 39

Regards sur...

Un félin en progression, le Chat forestier p. 42

Réseau d'espaces, réseau d'acteurs

- Le plan régional d'actions en faveur des Maculinea, un réseau d'acteurs au service de la conservation. p. 44
- L'action ciblée du Cen Centre-Val de Loire sur les solidages invasifs. p. 49
- Le pastoralisme, alliance entre élevage et gestion des milieux naturels pour la reconquête d'espaces de liberté de la Loire. p. 54

Du côté de l'ORB

- C'est quoi l'ORB Centre ? p. 60
- Un livre rouge en région Centre p. 61

Du côté des lecteurs et internautes

p. 62

Préconisations aux auteurs

p. 65

La revue / contacts

p. 66